





Inverno 2022 ainda segue tendências da pandemia



Dor e Febre

Bayer	14
Нурега	16
Johnson&Johnson	20
Sanofi	21

Alergias

Bayer08
Нурега09
Sanofi11



Tosse e Garganta

Hypera	23
Johnson&Johnson	24
P&G Health	25
Sanofi	26

Gripes e Resfriados

Нурега		•••••	• • • • •	••••	••••	••••	••••	12
P&G Hea	alth							13



Descongestionante

Нурега	•••••	•••••	 •••••	•••••	27
P&G He	alth		 		29

O Catálogo Mega Inverno é uma publicação da Panpharma, dirigida e distribuída exclusivamente aos farmacêuticos e profissionais da saúde. As opiniões publicadas não refletem, necessariamente, o ponto de vista da empresa e são de responsabilidade de seus respectivos autores. A responsabilidade dos anúncios publicados é exclusiva do anunciante.

Projeto Gráfico: Thatto Comunicação · Jornalista Responsável: Lígia Favoretto - MTB: 49.748 /SP Fale Conosco: faleconosco.sac@panpharma.com.br







Doenças	
respiratórias	

GSK	30
Нурега	32
Sanofi	33



Vitaminas

Bayer	39
Нурега	. 41
P&G Health	45
Sanofi	46

Ações de trade marketing para o Inverno 2022



Cuidados com a pele

Bayer	. 47
Coty	.48
Galderma	.49
-Нурега	51
sdin	.52
Johnson&Johnson	.54
_'Oréal DCA	.56

Nivea.....58

Antibiótico

GSK38







GALDERMA





















vida da população está sendo retomada aos poucos, mas ainda com atenção para as novas cepas do coronavírus, que fizeram os casos aumentarem no início do ano e tendem a voltar na temporada de outono-inverno, junto das doenças típicas de inverno. Para enfrentar a sazonalidade que a nova estação impõe, o varejo farmacêutico precisa estar altamente preparado para as demandas de saúde da população, principalmente quando todos

estão tentando entender como o País se comportará no pós-pandemia, que ainda não aconteceu.

Com o intuito de compreender o novo cenário desafiador e apontar as principais tendências para o inverno 2022 é preciso lembrar que a pandemia alterou o comportamento de compra de muitos brasileiros e muitos, pela força da circunstância, se tornaram digitais. Assim, a empresa precisa estar preparada para interagir e vender por diferentes canais.



"O fato é que no pós-pandemia teremos um *shopper* mais exigente, mais informado, menos paciente e com mais opções. Assim, é fundamental fazer o básico bem-feito como ter o produto certo, na loja certa, na quantidade certa, com o preço certo. Para isso, é fundamental ter parceiros de negócio que garantam este abastecimento contínuo até porque será a experiência que fará a diferença", recomenda o cofundador da Inteligência 360°, Olegário Araújo.

A importância da colaboração também se destacou. "Este é o momento de o varejo reforçar suas parcerias com fornecedores com o compartilhamento de informações, estabelecer uma maior previsibilidade nas compras e ter negociações mais estratégicas. A negociação totalmente transacional é focada no curto prazo e implica muito tempo em energia por economias que talvez não sejam relevantes. A pior consequência é não ter tempo para inovar e se diferenciar. Novas ideias para desenvolver o negócio virão da colaboração, mas isso implica em usar parte do tempo para pensar de forma criativa."

COM O INTUITO DE
COMPREENDER O NOVO
CENÁRIO DESAFIADOR E
APONTAR AS PRINCIPAIS
TENDÊNCIAS PARA
O INVERNO 2022
É PRECISO LEMBRAR
QUE A PANDEMIA ALTEROU
O COMPORTAMENTO
DE COMPRA DE
MUITOS BRASILEIROS

Comorbidades típicas da estação

É sabido que o inverno é a estação das doenças respiratórias. O tempo mais seco e as baixas temperaturas propiciam isso.

O Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, alerta para os casos de reinfecção e de transmissibilidade retomada do Covid-19, durante a temporada mais fria do ano. Com o avanço da vacinação, os casos tendem a continuar com um agravamento menor, se comparado a outras variantes, mas sem dúvida nenhuma a pandemia não passou e novas cepas podem surgir, comprometendo a saúde de quem convive com doenças crônicas, como:



DIABETES



HIPERTENSAO



OBESIDADE



além de agravar casos

de ASMA E BRONQUITE,

bem característicos do período.





TOP 10 CLASSES TERAPÊUTICAS INVERNO EM UNIDADES

PRODUTOS	MAT 2021/01	MAT 2022/01	CRESCIMENTO
Histamínicos sistêmicos	96.294.994	119.342.111	23,9%
Descongestionantes nasais	99.666.570	109.380.030	9,7%
Antigripais exceto anti-inflamatórios	77.441.130	103.468.431	33,6%
Expectorantes	56.276.971	84.671.888	50,5%
Preparo para garganta	35.078.481	44.160.296	25,9%
Antibióticos orais do tipo penicilinas de amplo espectro	33.252.903	40.307.247	21,2%
Associação com corticoides sistêmicos	24.100.706	31.938.534	32,5%
Antibióticos orais do tipo Cefalosporinas	27.067.756	28.029.940	3,6%
Corticoide Nasal sem anti-inflamatório	18.249.225	21.126.664	15,8%
DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Agonistas Beta 2)	17.213,219	20.259.665	17,7%
Outros	107.265.892	134.416.438	25,3%
TOTAL	591.907.848	737.101.245	24,5%

Fonte: Close-Up International/Base RM/MAT 2022/01





CATEGORIAS DE MAIOR OPORTUNIDADE EM VENDAS PARA O INVERNO 2022

Em medicamentos:

Analgésicos	Antitérmicos	Antigripais	Vitaminas com foco para as vitaminas C e D
-------------	--------------	-------------	--

Em correlatos:

Soro fisiológico para inalação	Termômetros	Oxímetros	Inaladores e umidificadores de ar
Álcool gel	Lenços descartáveis	Máscaras de prot	eção respiratória

Em perfumaria:

Hidratantes e óleos para corpo e rosto	Colorações para cabelos	Esmaltes
Protetores labiais	Máscaras de hidratação para os cabelos	

Fonte: consultora especializada em varejo farmacêutico, Silvia Osso









Claritin

Indicado para o alívio dos sintomas associados com a rinite alérgica e, também, para os sinais e sintomas da urticária e de outras alergias da pele.



CÓD. 400339 7891106912778 CLARITIN 10MG C/12 COMP



CÓD. 400340 7891106912785 CLARITIN 10MG C/6 COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

CLARITIN® (loratadina 10 mg). Indicações: Alívio temporário dos sintomas associados com rinite alérgica (por exemplo: febre do feno), como: coceira nasal, nariz escorrendo (coriza), espirnos, ardor e coceira nos olhos; é também indicado para o alívio dos sinais e sintomas de urticária e outras alergias da pele. Contraindicação: Sensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Cuidados e Advertências: Doença hepática grave. Reg. MS 1.7056.0110. CLARITIN® É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.













CÓD. 110280 7891142200143PREDSIM 20MG
C/20 COMP



CÓD. 110281 7891142177209PREDSIM 40MG
C/10 COMP



S/ACUCAR 120ML

CÓD. 105614 7891142177216PREDSIM 40MG
C/7 COMPR



COD. 102839 7891142177032PREDSIM 5MG
C/10 COMP



CÓD. 102840 7891142177049PREDSIM 5MG
C/20 COMP



CÓD. 102835 7891142177124 PREDSIM GTS 20ML



CÓD. 102836 7891142177155 PREDSIM SOL 100ML



CÓD. 102837 7891142177162 PREDSIM SOL 60ML

CONFIRA TAMBÉM:

CÓD.	EAN	DESCRIÇÃO
112304	7896641815027	ALEKTOS 2,5MG/ML PED ORAL 120ML
104855	7896094922037	ALEKTOS 20MG 30COMP
106754	7896094922044	ALEKTOS 20MG C/15 COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

CELESTAMINE® maleato de dexclorfeniramina + betametasona. Indicações: Celestamine® é indicado no tratamento adjuvante de doenças alérgicas do aparelho respiratório, como asma brônquica grave e rinite alérgica; nas doenças alérgicas da pele, como dermatite atópica (eczema), dermatite de contato, reações medicamentosas e doença do soro; e nas doenças alérgicas inflamatórias oculares, como ceratites (inflamações dorma), conjuntiva (conjuntiviva) e das porções intermas do olho (irite não-granulomatosa, corioretinite, iridocicilet, coroidite e uveite). Nestas doenças oculares, Celestamine® nitoe a fase aguda da inflamação, contribuindo para preservar a integridade funcional do globo ocular, enquanto se realiza o tratamento da infecção ou de distúrbio por outra causa com terapia específica. Não utilize Celestamine® e você já teve qualquer alergia ou alguma reação incomum a qualquer um dos componentes da fórmula do produto. Celestamine® está contraindicado para pacientes com infecção sistêmica por fungos, para prematuros e recém-nascidos, nos pacientes que estejam recebendo terapia com inibidores da monoaminoxidase (IMAOS) e para os que demonstrarem hipersensibilidade a qualquer dos componentes de sua fórmula ou a fármacos de estrutura química similar. Exclusivo Xarope / Solução gotas: Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. Não utilizar este medicamento durante a gravidez e lactação, exceto sob orientação médica. M5: 1.7817.0783. PREDSIM® (prednisolona) Predsim® é indicado como agente anti-inflamatório e imunossupressor em patologias cujos mecanismos fisiopatológicos envolvam processos inflamatórios e/ou autoimunes; para o tratamento de condições endócrinas (glândulas); e em composição de esquemas terapêuticos em algumas neoplasias. Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes alérgicos à prednisolona ou a qualquer outro componente da fórmula; e para pacientes com infecções fúngicas sistêmicas ou infecções não controladas. M5: 1.7817.0789.





Polaramine

Linha completa para o alívio das alergias. Rinite, picadas de insetos e alergia de pele.



Polaramine
Indicate de descriptionina
10 mg/g

Polaramine
Tomp/g

Residual to the state of the s

CÓD. 401061 7891142171061POLARAMINE
GTS 20ML

CÓD. 401065 7891142171719POLARAMINE 2MG
C/20 COMP (NOVO)

CÓD. 401064 7891142171191POLARAMINE 10MG
CR DERM 30G



CÓD. 401063 7891142171757POLARAMINE SOL 120ML (NOVO)



CÓD. 401062 7891142171733POLARAMINE REPTBS
C/12 COMP NOVO

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

POLARAMINE® (Maleato de dexclorfeniramina) Indicações: Polaramine® é destinado para alergia, prurido, rinite alérgica, urticária, picada de inseto, conjuntivite alérgica, dermatite atópica (um tipo de inflamação na pele) e eczemas alérgicos (dermatite). Contraindicações: Este medicamento é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou a outros anti-histamínicos de estrutura química similar. Polaramine®, como os demais anti-histamínicos, não deve ser usado em prematuros ou recém-nascidos e em pacientes que estão fazendo uso de inibidores da monoaminoxidase (IMAOs). Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. MS: 1.7817.0811.



sanofi





Allegra

Com rápida ação antialérgica, bloqueia os efeitos da histamina, uma substância produzida pelo próprio corpo e que causa os sintomas da alergia.



CÓD. 100114 7891058006716 ALLEGRA D C/10 COMP D1



CÓD. 100117 7891058004354ALLEGRA PED
SUSP 150ML



CÓD. 100118 7891058004347ALLEGRA PED
SUSP 60ML



CÓD. 100119 7891058168049 ALLEGRA 120MG C/10 COMP **CÓD. 100120 7891058169015** ALLEGRA 180MG C/ 10 COMP **CÓD. 100122 7891058024314** ALLEGRA 60MG C/10 COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

ALLEGRA® (Cloridrato de fexofenadina). Indicações: é um anti-histamínico destinado ao tratamento das manifestações alérgicas, tais como sintomas de rinite alérgica (incluindo espirros, obstrução nasal, prurido, coriza, conjuntivite alérgica) e urticária (erupção avermelhada e pruriginosa na pele). Contraindicação: não deve ser utilizado em caso de alergia aos componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos de idade para rinite alérgica sazonal e menores de 6 meses de idade para urticária idiopática crônica. Em crianças abaixo de 6 anos de idade que apresentam alergias de pele recomenda-se consultar o seu médico, caso os sintomas persistam. MS 1.1300.0258







Coristina d PRO

Indicado no combate dos sintomas da gripe e dos resfriados.



EM BREVE 7891142982100CORISTINA D
PRO 16 COMP

EM BREVE 7891142982179CORISTINA D PRO BLIST 50X4 COMP NOVO



EM BREVE 7891142982155CORISTINA D
PRO C/8 COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

Coristina DPro. (Cloridrato de Fenilefrina + Paracetamol + Maleato de Clorfeniramina) Indicado no tratamento sintomático dos distúrbios congestivos e exsudativos decorrentes da gripe, resfriado erinites alérgicas (corizas, dores musculares, febre, cefaleia, congestão nasale demais sintomas presentes nos estados gripais). É contraindicado parapacientes com conhecida hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não deveserad ministrado a pacientes com hipertensão, do ençacardíaca, diabetes, glaucoma, hipertrofia da próstata, do ença renal crônica, insuficiência hepática grave, disfunção tireoidiana, gravidez elactação sem controle médico. MS 1781707970020









Indicado no tratamento dos sintomas de gripes e resfriados. Alívia a congestão nasal, coriza, febre, dor de cabeca e dores musculares presentes nos estados gripais.





CÓD. 404721 7500435188050 VICK PYRENA GRIP-7 C/10 CAPS

CÓD. 404722 7500435188067 VICK PYRENA GRIP-7 C/20 CAPS



CÓD. 404720 7500435188524 VICK PYRENA GRIP-7 24BL C/5 CAPS



CÓD. 401382 7501001310288 VICK PYRENA MEL E LIMAO 5GX5



CÓD. 401385 7896093001054 VICK PYRENA MEL E LIMAO 5GX50IT



CÓD. 103869 7501007447285 VICK PYRENA **CAMOMILA** 50 SACHE 5G



CÓD. 401384 7501006718065 VICK PYRENA MACA/CAN 50 SACHE 5G



CÓD. 404432 7500435177450 VICK PRIMEIRA **PROTECAO** 15ML

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

VICK PYRENA® (paracetamol). Indicação: Vick Pyrena® é destinado ao alívio da dor de cabeça, febre e dores no corpo, associados à gripe. Contraindicação: Vick Pyrena® é contra indicado para pacientes alérgicos ao paracetamol ou a qualquer componente do produto. Não use Vick Pyrena® caso tenha doença no figado ou rins. Este medicamento é contra indicado para menores de 12 anos. Se você está grávida ou amamentando, consulte um médico antes de usar este medicamento. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. É aconselhável cuidado na administração de paracetamol em pacientes com função hepática comprometida incluindo aqueles com doença hepática alcoólica não cirrótica. Os perigos de overdose são majores naqueles com doença hepática alcoólica. Não use qualquer outro produto que contenha paracetamol. MS:1.2142.0001. VICK PYRENA® GRÍP 7 (paracetamol, maleato de clorfenamína, cloridrato de fenilefrina) Indicação: no tratamento dos sintomas de gripes e resfriados como o alívio da congestão nasal, coriza, febre, dor de cabeça e dores musculares presentes nos estados gripais. MS: 1.2142.0672.







CÓD. 400122 7891106004213 ASPIRINA AD 500MG C/100 COMP

Aspirina

Ação analgésica, antitérmica e anti-inflamatória. É indicado para o alívio de dores de cabeça, dor nas costas, dores musculares, dores de garganta, de dente e febre.





CÓD. 402422 7793640000143 ASPIRINA 500MG C/ 20 COMP



CÓD. 402482 7891106910118 ASPIRINA C 10 COMP

CÓD. 400123 7891106000888ASPIRINA C EFV
LIMAO 50X2 COMP



CÓD. 402941 7891106908719ASPIRINA MICROATIVA
500MG 100CP

CÓD. 402940 7891106908696ASPIRINA MICROATIVA
500MG 20CP



CÓD. 400212 7891106900775 CAFIASPIRINA C/100 COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

ASPIRINA® (Ácido acetilsalicílico) Indicações: Tratamento sintomático de febre e / ou dor leve a moderada, como dores de cabeça, dor de infecção semelhante à gripe, dor de dente e dores musculares. Observar as informações sobre o uso por crianças e adolescentes Observações: Contém carbonato de sódio. Não use para tratar a dor ou febre por mais tempo do que o indicado na bula sem orientação médical Consulte a bula e pergunte ao seu médico ou farmacêutico sobre os riscos e efeitos adversos. M\$: 7.056.00.00. ASPIRINA® MICROATIVA (Ácido a cetilsalicífico), olinicações: Dor leve a moderada, como dor de cabeça, dor de garganta e dor nos membros); febre. Observe as informações sobre o uso por crianças. Notas: O corante amarelo-laranja S (E110) pode desencadear reações de hipersensibilidade. Contém aspartame. Observe o folheto informativo. Não use para tratar a dor ou febre por mais tempo do que o indicado na bula sem orientação médical Consulte a bula e pergunte ao seu médico ou farmacêutico sobre os riscos e efeitos adversos. M\$: 1.0429.0037. ASPIRINA® (C (Ácido acetilsalicífico, ácido ascórbico (vitamina C)) Dor leve a moderada, como dor de cabeça, dor de dente; dor menstrual; sintomas dolorosos associados a resfriados (por exemplo, dor de cabeça, dor de garganta e dor nos membros); febre. Observe as informações sobre o uso por crianças. Notas: Contém compostos de sódio. Observe o folheto informativo. Não use para tratar a dor ou febre por mais tempo do que o indicado na bula sem orientação médical Consulte a bula e pergunte ao seu médico ou farmacêutico sobre os riscos e efeitos adversos. CAFIASPIRINA® (Ácido acetilsalicífico e cafeña) Indicações: Dor leve a moderada, por exemplo, dor de cabeça, dor de dente, menstrual, inflamação. Observe as informações sobre os riscos e efeitos adversos. CAFIASPIRINA® (Ácido acetilsalicífico e cafeña) Indicações: Dor leve a moderada, por exemplo, dor de cabeça, dor de dente, menstrual, inflamação. Observe as informações sobre o uso por crianças. Consulte a bula e pergunte ao seu







Flanax

Indicado para dores, inflamação e febre, no tratamento da dor no corpo.



CÓD. 403928 7891106913683FLANAX 275MG C/8
COMP REVEST



CÓD. 403580 7891106912471 FLANAX 550MG DISPLAY 10X2



CÓD. 400543 7891106006507FLANAX AD 550MG
C/10 COMP



CÓD. 403929 7891106913676FLANAX 275MG
C/30X2 COMP REV



CÓD. 400545 7891106006491FLANAX 275MG
C/20 COMP



SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

FLANAX® (naproxeno sódico 275 mg e 550 mg). Reg. MS-1.7056.0047. Indicações: dores agudas causadas por inflamação; dor e febre em adultos, sintomas de gripe e resfriado; dores musculares e articulares; dor após traumas: entorses, distensões, contusões, lesões leves decorrentes de prática esportiva. Contraindicações: reações alérgicas decorrentes da ingestão de anti-inflamatórios não esteroidais. Cuidados e Advertências: dor de origem gastrintestinal. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASOS DE ÚLCERA, GASTRITE, DOENÇA DOS RINS OU SEVOCÉ JÁ TEVE REAÇÃO ALÉRGICA A ANTI-INFLAMATÓRIOS.







Alivium

Para o alívio da febre e da dor, tais como: dores decorrentes de gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, cólicas menstruais e dores musculares.







CÓD. 403730 7891142203434 ALIVIUM 400MG C/20 CAPS GEL



CÓD. 400069 7891142115430 ALIVIUM 400MG C/10 COMP **CÓD. 403081 7891142203410**ALIVIUM 400MG
BLISTER 32X3 CAPS

CONFIRA TAMBÉM:

112667

CÓD. EAN DESCRIÇÃO

7891142205490 ALIVIUM GC 200MG/ML SUSP GTS20ML



CÓD. 403080 7891142201621 ALIVIUM 400MG C/8 CAPS GEL



CÓD. 400070 7891142115478 ALIVIUM 50MG GTS 30ML



CÓD. 403083 7891142115126 ALIVIUM 600MG C/10 CAPS GEL



CÓD. 400068 7891142115492ALIVIUM 100MG
GTS 20ML



CÓD. 400067 7891142115508ALIVIUM SUSP
ORAL 100ML

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

ALIVIUM CÁPSULA MOLE. Ibuprofeno 400mg. Indicações: para alívio temporario da febre e de dores de leve a moderada intensidade como: dor de cabeça, dor nas costas, dor muscular, enxaqueca, cólica menstrual, de gripes e resfriados comuns, dor de artrite e dor de dente. MS 1.7817.0826. ALIVIUM. COMPRIMIDO REVESTIDO. ibuprofeno 400mg. Indicações: para redução da febre e o alívio temporário de dores leves a moderadas tais como: dor de cabeça, dor de dente, dor muscular, dor na parte inferior das costas, dores relacionadas a problemas reumáticos não articulares e periarticulares, dores associadas a processos inflamatórios e/ou traumáticos e dores associadas a gripes e resfriados. MS 1.7817.0807. ALIVIUM. SUSPENSÃO. ibuprofeno 30mg/mL. SUSPENSÃO GOTAS. ibuprofeno 50mg/mL e 100mg/mL. Indicações: para redução da febre e para o alívio de dores, tais como: dores decorrentes de gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, cólicas menstruais e dores musculares. MS 1.7817.0807.









CÓD. 400776 7897322706320 LISADOR 25X4 COMP



CÓD. 400777 7897322701752 LISADOR 25X8 COMP



CÓD. 400773 7897322702209LISADOR C/16
COMP



CÓD. 402736 7897322707211 LISADOR C/24 COMP



CÓD. 403461 7896094916289LISADOR DIP 1G
25X4 COMP



CÓD. 403462 7896094916296 LISADOR DIP 1G 25X8 COMP



CÓD. 403463 7896094916227LISADOR DIP 1G
C/10 COMP



CÓD. 403460 7896094916234 LISADOR DIP 1G C/20 COMP







CÓD. 102820 7891142137135 PRATIUM SUSP GTS 15ML

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

LISADOR® DIP dipriona monoidratada. LISADOR DIP SOLUÇÃO GOTAS. MS 1.7817.0877. LISADOR DIP. COMPRIMIDO. MS 1.7817.0842. Indicação: Este medicamento é indicado como analgésico (para dor) e antitérmico (para febre). Contraindicação: LISADOR® DIP ão deve ser utilizado caso você tenha: alergia ou intolerância à dipriona ou a qualquer um dos componentes da formulação ou a outras pirazolídinas (ex: fenzona, proprienazona, isopropilaminofenzaona, indificação: Casa de care de júblicos famos dos anquel; com um destas substancias; função da medula dossea periguldada (ex: agós tratamento citostático) ou doenças do sistema hematopoiético (responsável pela produção das células sanguineas); desenvolvido broncoespasmo (contração dos brônquios levando a chiado no peito) ou outras reações anafilactoides, como urticária (erupção a pale que causa occeira), nínite (irritação e inflamação da mucosa do nariz), angioedema (inchaço em região subcutañae ou em mucosas) depois do uso do mediciamentos para dor (ex: salicitatos, paracetamol, diclofenzor, ibuproita ou proprior de paracetamo, diclofenzor, ibuproita da gificose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD), pelo risco de hemólise (destruição dos glóbulos vermelhos, o que pode levar à anemia). Este medicamento é contraindicado para menores de 15 anos. Este medicamento ado para pacientes com hiperescribilidade conhecida a qualquer componente das gravides. El MSADOR® (ilsadoc Comprimido. Dipriona menoridada 50 aprometazina 5 mpe el ordivator de adificina compeliaria toma de individado para pacientes com hiperescribilidade conhecida a qualquer componente da formula do porduto. Este medicamento é contraindicado para pacientes y complemas renais, problemas no coração, nos vasos sanguineos, no figado pirazolónicos (como a femilbutazona) ou ao ádio acetilisalicito, particulammente, naqueles pacientes nos quales judendende da origen portina federa a qualquer componente da formula do portudos. Este medicamento e contraindicado para pacientes que aprisentam problemas renais, problemas no coração, nos







Tem ação analgésica e também atua como anti-inflamatório para alívio das dores.

Doril



CÓD. 401989 7896094904675 DORIL C/20 COMP



CÓD. 400436 7896094901254 DORIL 25X6 COMP



CÓD. 403771 7896094917323 DORIL DC 500 C/16 COMP

CONFIRA TAMBÉM:

 CÓD.
 EAN
 DESCRIÇÃO

 404660
 7896094920910
 DORIL ENXAQUECA C/8 COMP REV

 403770
 7896094917330
 DORIL DC 500 C/100 COMP



CÓD. 402891 7896094908529DORIL ENXAQUECA
C/18 COMP REV

CÓD. 402571 7896094906310 DORIL ENXAQUECA 25X4 COMP



CÓD. 400828 7896094904156 MELHORAL AD 25X8 COMP



CÓD. 400831 7896094904125MELHORAL INF
25X8 COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

DORIL® DORIL Comprimido. ácido acetilsalicílico 500mg, cafeina 30mg, Indicações: analejesico e antitérmico. MS 1.7817.0007. DORIL ENXAQUECA. Comprimido revestido, paracetamol 250mg, ácido acetilsalicílico 250mg, cafeina 65mg, Indicações: alifoi de dores leves a moderadas e emaquecas. MS 1.7817.0323. DORIL DC 500. Comprimido de piona 500mg e acfeina 65mg, Indicações: analejásico especialmente para o tratamento de dores de cabeça e enxaqueca. MS 1.7817.0859. MELHO RALI.ºº á contraindicado como analejósico e antipietiros, especialmente para, e retudação da feira e dor de cabeça, a indicação esta indicação como analejósico e antipietiros, especialmente para estatamento a feira e formal a do produto. MELHORALI.ºº á contraindicado para pacientes com hipresensibilidade ao ácido acetilsalicilico, a outros salicilatos ou a qualquer outro componente da fórmula do produto. MELHORALI.ºº á contraindicado para pacientes predispostos a dispepsias (indigestão), ou sabidamente portadores de alguma lesão da mucosa gástrica (úlcreas). Também é contraindicado para pacientes com intelerância gástrica ao ácido acetilsalicilico e portadores de lesão hepática (no figado) grave, além de pacientes hemofilicos (com problemas de sangamento). Pelo cornieido de ácido acetilsalicilico, MelhoralMM é contraindicado em caos de denque suspeita ou diagnosticada. MELHORALI.ºº é contraindicado nos três primeiros meses de gravidez e após esse período, só deve ser empregado nos caoss de absoluta necessidade e sob orientação médica. Sua utilização também é contraindicado an grávidas no final da gestação por prolongar o tempo de sangamento favorecendo a corrência de homoragais. MS. 1.7817.0004.











CÓD. 404686 7896094999558 NEOSALDINA DIP 1G C/10 COMP



SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

NEOSALDINA® Drágeas. Dipirona, mucato de isometepteno, cafeína. Solução oral. dipirona, cloridrato de isometepteno, cafeína. Indicações: analgésico e antiespasmódico para o tratamento de diversos tipos de dor de cabeça, incluindo enxaqueca ou para o tratamento de cólicas. MS 1.7817.0899. NEOSALDINA DIP. Comprimidos. Dipirona monoidratada. Indicações: analgésico e antitérmico. MS 1.7817.0912.



Johnson Johnson



Tylenol DC

Combinando paracetamol e cafeína, promove o alívio rápido das dores de cabeça e dores corporais.



CÓD. 401308 7891010249298TYLENOL DC
25X4 COMP

CÓD. 401307 7896212413560 TYLENOL DC C/20 COMP



CÓD. 401935 7891010986155 TYLENOL 500MG C/20 COMP



CÓD. 103646 7896212415618TYLENOL SINUS
500MG C/24 COMP



CÓD. 403827 7891010246952 TYLENOL SINUS C/36 COMPCOMP



CÓD. 401306 7896212409457 TYLENOL CRIANCA 60ML



CÓD. 401309 7896212479924 TYLENOL 200MG INF 15ML



CÓD. 401305 7896212428861TYLENOL BEBE
GTS 15ML

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

TYLENOL* 500MG (paracetamol) Indicações: Este medicamento é indicado em adultos para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a artificas coliciasmentsuias. Contraindicações: Você ñão deve usar TYLENOL* Set tiver alergia ao paracetamol o qualquer componente de sua fórmula. Este medicamento é contraindicações de 12 anos. MS: 1.1236.3326. TYLENOL* BEB / TYLENOL* CRIANÇA (paracetamol) Indicações: Estes medicamento so a indicados para e a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente e dor de garganta. Contraindicações: TYLENOL* Criança não devem ser administrados se a criança tiver alergia ao paracetamol o u a qualquer outro componente de sua fórmula. M.S: 1.1236.3326. TYLENOL* DC (paracetamol e cafera) Indicações: TYLENOL* DC e indicado para o alivio sintomático de dores de cabeça, sendo também útil para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores associadas a artifites e cólicas menstruais. Contraindicações: Você ñão deve usar TYLENOL* DC se tiver alergia ao paracetamol e cafera ou a outro componente de sua fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. M.S: 1.1236.3426. Tylenol* Sínus* (Paracetamol + Cloridato de pseudoefedrina) Este medicamento é indicado para o alívio temporário dos sintomas decorrentes de gripes, resfriados comuns es inusites tais como congestão nasal, obstrução nasal, ostrução mala, coriza, mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, entre outros; e para redução da febre e para o alávio temporário de dores leves a moderadas, tais como: o des asociadas a artifite e colicas mentros dos sintomas decorrentes de gripes, resfriados comuns es inusites tais como congestão nasal, obstrução nasal, ostrução mala esta de la composição de debe casa formula. Este medicamento



sanofi

Dorflex

Potente combinação: analgésico e relaxante muscular. Trata as dores musculares causadas principalmente por má postura e movimentos repetitivos.





CÓD. 403710 7891058022136 DORFLEX C/24 COMP **CÓD. 402970 7891058017507** DORFLEX C/36 COMP



CÓD. 400428 7891058009458 DORFLEX GTS C/20ML



CÓD. 106926 7891058017392 DORFLEX C/300 COMP



CÓD. 403931 7891058022785 DORFLEX UNO 1G C/100 COMP



CÓD. 404270 7891058000103 DORFLEX UNO 1G C/20 COMP **CÓD. 403930 7891058022815** DORFLEX UNO 1G C/10 COMP



CÓD. 403923 7891058022792DORFLEX UNO 1G
C/10 COMP EFERV

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

DORFLEX® UNO (dipirona monoidratada). Indicação: analgésico e antitérmico. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. Contraindicação: DORFLEX UNO não deve ser utilizada caso você tenha: alegria ou intolerância à da dipirona ou a qualquer um dos componentes da formulação ou a outras pirazolidinas (ex. fenazona, propifenazona, siona, fenilbutazona) incluindo, por exemplo, experiência prévia de agranulocitose (diminuição acentuada na contagem de glóbulos brancos dos sangue) com uma destas substâncias; função a medula óssea prejudicada (exc. após tratamento citostático) ou doenças do sistema hematopoiético (responsável pela produção das células sanguíneas); desenvolvido broncoespasmo (contração dos brônquios levando a chiado no peito) ou outras reações anafilactoides, como urticária (erupção na pele que causa coceira), ninte (irritação e inflamação da mucosa do nariz), angioedema (inchaço em região subcutânea ou em mucosas) depois do uso de medicamentos para dor (exc. salcilatos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, naproxeno); porfiria hepática aguda intermitente (doença metabólica que se manifesta através de problemas na pele e/ou com complicações neunológicas) pelo risco de indução de crises de porfiria; deficiência congênita da glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD), pelo risco de hemólise (destruição dos glóbulos vermelhos, o que pode levar à anemia); gravidez e amamentação. Este medicamento é contraindicado para menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5 kg. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgiãodentista. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. MS 1.8326.0460. DORFLEX® (dipirona monoidratada, cirtato de orfenadrina, cafeina anidra). Indicações: no alivivo da dor associada a contraturas musculares, individo cefaleia tensional. MS: 1.1300.0183. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS.



sanofi







CÓD. 400961 7891058001155NOVALGINA 1G
C/10 COMP



CÓD. 400962 7891058011222NOVALGINA 1G
C/100 COMP



CÓD. 402191 7891058015770NOVALGINA EFERV
1GR C/100 COMP



CÓD. 400958 7891058000165NOVALGINA GTS
20ML



CÓD. 400957 7891058000172NOVALGINA GOTAS
FR VIDRO 10ML



CÓD. 400964 7891058464073NOVALGINA 50MG
SOL 100ML



CÓD. 400956 7891058008635 NOVALGINA C/30 COMP





CÓD. 400955 7891058001148NOVALGINA BLISTER
25X4 COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

NOVALGINA® (dipirona monoidratada). Indicação: analgésico e antitérmico. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. Contraindicação: NOVALGINA ñão deve ser administrada a pacientes: com hipersensibilidade à dipirona ou a qualquer um dos componentes da formulação ou a outras pirazolonas (ex.: fenazona, própifenazona, isopropilaminofenazona) ou a pirazolidinas (ex.: fenibutazona, oxifembutazona) incluindo, por exemplo, experiência prévia de agranulocitose com uma destas substâncias; com função da medula óssea prejudicada (ex.: após tratamento citostático) ou doenças do sistema hematopoiético; que tenham desenvolvido broncoespasmo ou outras reações anafilactoides (ex.: urticária, rinite, angioedema) com analgésicos tais como salicilatos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, naproxeno; com porfiria hepática aguda intermitente (risco de indução de crises de porfiria); com deficiência congênita da glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD) (risco de hemólies); gravidez e lactação (vide "Advertências e Precauções — Gravidez e Lactação"). Este medicamento e contraindicado para menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5 kg. Categoria de risco na gravidez: D. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. MS. 1.8326.0351 NÃO USE ESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRÁVIDEZ E EM CRIANÇAS MENORES DE 3 MESES DE IDADE. EM CASO DE FEBRE OU ALERGIA, PROCURE SEU MÉDICO.









S Blumel

Xarope expectorante e mucofluidificante em caso de tosse produtiva.





CÓD. 110621 7896714274799BLUMEL HEDERA 15MG/ML XPE C100ML

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

BLUMEL® HEDERA extrato seco de folhas de Hedera Helix L. Indicação: BLUMEL® HEDERA xarope é indicado como expectorante e mucofluidificante em caso de tosse produtiva. Contraindicação: Pacientes com histórico de hipersensibilidade (alergia) a substância ativa ou a plantas da família Araliaceae ou a qualquer um dos componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado em crianças abaixo de 2 anos de idade pelo risco de agravar sintomas respiratórios. Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes que apresentam intolerância à frutose (um tipo de açúcar); somente o médico, após avaliação do risco em relação aos benefícios do produto poderá determinar se este tipo de paciente pode fazer uso do produto. Informe seu médico sobre a ocorrência de gravidez durante o tratamento ou após o seu término e também se estiver amamentando. BLUMEL® HEDERA xarope deve ser administrado com cautela durante a gravidez e lactação. Categoria de risco na gravidez: C. Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade. MS: 1.5584.0409.

Johnson Johnson



CÓD. 401957 7891010974930BENALET MENTA
13X4 PAST



Benalet

Um tratamento auxiliar nos quadros de afecções das vias aéreas superiores, diminuindo a sensação de irritação na garganta, inibindo a tosse e aliviando o processo inflamatório local.



CÓD. 401956 7891010974923 BENALET MEL LIMAO 13X4 PAST



CÓD. 400144 7891268402018BENALET MENTA
C/12 PAST





CÓD. 400143 7891268402025BENALET MEL
LIMAO C/12 PAST

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO





CÓD. 103870 7500435153089 VICK XPE MEL 120ML



CÓD. 401391 7500435153065 VICK XPE MEL 240ML



Vick Mel

Ajuda na eliminação do catarro em tosses produtivas. O início da ação é rápida.



CÓD. 404342 7500435153072VICK XPE INFANT
120ML+COPO MEDID



Xarope
44E
primers Clinical
primers Clin

CÓD. 103871 7590002023228VICK 44E XPE
120ML



CÓD. 404012 7500435144384 VICK 44E XPE 240ML





CÓD. 705269 7896093002181VICK CEREJA 24X5
PAST DISPLAY



CÓD. 705266 7896093002150VICK LARANJA 24X5
PAST DISPLAY



CÓD. 705268 7896093002167VICK LIMAO 24X5
PAST DISPLAY



CÓD. 705267 7896093002174VICK MENTA 24X5
PAST DISPLAY

sanofi



Mucosolvan

Indicado para o

CÓD. 400877 7891058021573 MUCOSOLVAN XPE

PED 120ML

CÓD. 400876 7891058021566 MUCOSOLVAN XPE **AD 120ML**

CÓD. 400879 7891058021559 MUCOSOLVAN 7,5MG SOL ORAL 50ML



CÓD. 400183 7891058021627 **BISOLVON XPE EXP** PED 120ML

CÓD. 400182 7891058021610 **BISOLVON XPE EXP** AD 120ML



CÓD. 400181 7891058021535 **BISOLVON SOL EXP** 50ML

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
MUCOSOLVANº (cloridrato de ambroxol). Indicações: Mucosolvan está indicado para o tratamento das deenças broncopulmonares (brônquios e pulmões) agudas e crônicas para facilitar a expectoração (soltar o catarro do peito) quando houver acúmulo de secreção. MS 1.1300.1173. BISOLVONº (cloridrato de bromexina), Indicações: Bisolvone indicado para o tratamento de deenças broncopulmonares (dos brônquios e dos pulmões), ajudando a dissolver o catarro e facilitando a expectoração (eliminação do catarro). MS 1.1300.1166.









CÓD. 404412 7896094920033 RINOSORO XT JET 0,9% SPR INF NAS FR100ML



CÓD. 402253 7897322709376 RINOSORO JET 0,9% C/100ML



CÓD. 403753 7896094917385 **RINOSORO JET** INF. 0,9% 100ML



CÓD. 403971 7896094917835 RINOSORO JET XT 0,9% C/100ML



CÓD. 401131 7897322704944 RINOSORO SIC 3% SPRAY 50ML



CÓD. 401129 7897322706658 RINOSORO SIC INF SPRAY 50ML



CÓD. 401130 7897322704593 RINOSORO SIC SPRAY 50ML



CÓD. 403791 7896094917002 RINOSORO XT GOTAS 30ML



CÓD. 401127 7897322702032 **RINOSORO** GTS PED 30ML (NOVO)

CONFIRA TAMBÉM:

CÓD.	EAN	DESCRIÇÃO
404712	7896094925878	RINOSORO ALTO VOL 30SACH+FR 250ML
404713	7896094925885	RINOSORO ALTO VOLUME

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

RINOSORO® SIC 3% cloreto de sódio. Indicação: RINOSORO® SIC 3% é um descongestionante nasal, indicado para congestão nasal, obstrução nasal e nariz entupido. Contraindicação: RINOSORO® SIC 3% é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade (alergia) conhecida aos componentes da fórmula. Este medicamento é contraíndicado para menores de 3 anos. MS: 1.7817.0081.





Blusoro Jet

Descongestionante nasal em *spray* bico infantil e sem conservantes.



CÓD. 404510 7896094921245BLUSORO JET INFANTIL
0,9% 100ML

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

BLUSORO (cloreto de sódio) Indicações: uidificante e descongestionante nasal. MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA № 199/2006 AFE № 1.07817-7.









CÓD. 404600 7500435182331 VICK VAPO SPRAY 100ML



Vapo Spray

Fluidificante e a secreção da mucosa nasal, favorecendo a sua eliminação.



CÓD. 715167 7500435140157 VICK BABYRUB 12G DISPLAY C/6



CÓD. 715170 7501001168797 VICK BABYRUB FRASC 50G



CÓD. 401388 7896093001030 VICK VAPORUB 12G C/24



CÓD. 401387 7896093000217 VICK VAPORUB **INALADOR C/12**



7590002032817 VICK VAPORUB 30G



CÓD. 401390 7590002012468 VICK VAPORUB 50G



CÓD. 404340 7500435157599 VICK VAPORUB 100G

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

INALADOR VICK® (levomentol e cânfora). Indicações: ajuda a desentupir o nariz e respirar livremente. M.S. 1.2142.0011. VICK VAPORUB® (levomentol, cânfora e óleo de eucalipto). Indicações: é destinado ao alívio da tosse, da congestão nasal e do mal estar muscular que acompanham gripes e resfriados. M.S. 1.2142.0009.







CÓD. 100061 7896269900150 **AEROLIN SPRAY** C/200 DOSES



CÓD, 101520 7896015516581 FLIXOTIDE SPRAY 50MCG X 120D



CÓD. 101519 7896269900808 FLIXOTIDE SPRAY 250MCG X 60D



CÓD. 106162 7896015528843 **RELVAR 200/25** MCG 30 DOSES



CÓD. 106161 7896015528829 **RELVAR ELLIPTA** 100+25MCG 30 DOSE

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

and to give bod opposition will criminate to misculate the miscular to misculate the miscular temperature and the proposition of the proposition o





Trelegy

É indicado para o tratamento de manutenção de pacientes adultos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).



CÓD.

CONFIRA TAMBÉM:

EAN

7896269955136

CÓD. 111155 7896015591212 TRELEGY 100+62 5+25MCG C/30DOSES



CÓD. 103201 7896269955204 SERETIDE SPRAY 25/125MCG 120D0SE



CÓD. 103202 7896269955372 SERETIDE SPRAY 25/250MCG 120DOSE



Seretide proportato de futica



CÓD. 103200

7896269901720

SERETIDE DISKUS

50/250MCG 60 DOS



DESCRIÇÃO

SERETIDE SPRAY

25/50MCG 120DOSES

CÓD. 103204 7896269901744 SERETIDE DISKUS 50/500MCG 60 DOS



CÓD, 103199 7896269901706 SERETIDE DISKUS 50/100MCG 60D

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

TRELEGY® (furvato de fluticasona/umecidinio/vilanterol). NDICAÇÕES: é indicado para o tratamento de manutenção de pacientes adultos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) moderada (e um histórico documentado de ≥2 exacerbações moderadas ou ≥1 exacerbação grave nos últimos 12 meses) ou DPOC grave a muito grave, que não estejam adequadamente tratados com monoterapia ou terapia dupla. POSOLOGIA: Adultos acima de 18 anos: uma inalação uma vez ao dia. CONTRAINDICAÇÕES: Pacientes com alergia grave à lactose ou à proteína do leite ou que tenham apresentado hipersensibilidade a furoato de fluticasona, umecididino, vilanterol ou qualquer um dos excipientes. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Tielegy não deve ser usado para alivio de sintomas agudos. Como ocore com outras terapias inalatórias, a administração de Tielegy, pode produzir broncoespasmo paradoxal. Efeitos cardiovasculares tais como arritmia cardiaca, fibrilação atrial e taquicardia, podem ser observados após a administração de Tielegy. Deve-se ter cautela em pacientes com glaucoma de ângulo estreito qui retenção urinária. Não é necessário nenhum ajuste de dose em pacientes com mais de 65 anos, em pacientes com insuficiência renal e em pacientes com insuficiência henática leve a moderada. Este medicamento contém lactose GRAVIDEZ E LACRAÇÃO. Telegy só deve ser usado dunante a gravidez se o beneficio esperado para a máe justificar o risco para o feto. Não se sabe se os ingrelientes de Tielegy podem passar para o leite matemo. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Bioqueadores beta2-adrenégicos podem enfraquecer ou antagonizar o efeito de agonistas de beta2-adrenérgicos, como vilanterol. Caso betabloqueadores sejam necessários, betabloqueadores cardiosseletivos devem ser considerados; entretanto, deve-se tomar cuidado durante o uso concomitante de betabloqueadores, tanto seletivos quanto não seletivos. A administração concomitante de frelegy com outros antagonistas muscarínicos de ação prolongada ou agonistas beta2-adrenérgicos de ação prolongada não foi estudada e não usamer uso concominante re-creativo, perma servicio y quanto noto servicio. A cuministrata qua concominante del retroy, con cours antiquo se apor provingiante a responsa quanto qua gonesas peta-a-deterrigidos por del recomendado, mais vez que pode petencializar as reações advessas. REVIGOS ADVERSAS. Comunes: presentoria, infecção do trato urinario, efalidas, tosse, dor ordaringea, artelaja, dorsalpia, constipação. Dados pós-comercialização: não há dados disponives. SUPERDOSAGEM; pode podruzi raias, sintomas ou efeitos adversos associados às agões farmacológicas dos seus componentes individuais. Para dados competes sobre a segurança do medicamento, a buta na integra devete as podras de solicitada a empresa atravales do Departamento de Informações Médicas da SCR (000,007 122 33 ou medinforgação, com). VENDA SOB PRESCRIÇÃO MEDICA Reg. MS: 1.0107.0344 mBL_11277_ Telegy_po_inabaca — GOSOS. SERETIDE*(xinafosto de salmeterol/propionato de fluiticasona). INDICAÇÕES: Sereide* está indicado no tratamento de manutenção da asma e devença pulmorar obstrutiva ofinica (DPOC), incluindo bronguite critical e enfisema pulmonar POSILOGIA. Asma – Adultuse adolescentes acima de 12 anos. Seretide® DISKUS®-50/100, 90/250 ou 50/500mg – uma inalação, duas vezes ao dia. Seretide® PRAN: 25/50 25/250 mcg – duas inalações, duas vezes ao dia. Seretide® PSRAS-55/50 25/21/25 ou 25/250 mcg – duas inalações, duas vezes ao dia. Seretide® PSRAS-55/50 25/21/25 ou 25/250 mcg – duas inalações, duas vezes ao dia. Seretide® DISKUS®-50/100 mcg – uma inalação, duas vezes ao dia. Seretide® DISKUS®-50/100 mcg – uma dos sintomas agudos e não deve ser suspenso abruptamente. Seretide" deve ser administrado com cautela a pacientes portadores de tuberculose pulmonar ativa ou quiescente, portadores de tireotoxicose, assim como em pacientes com doenças cardiovasculares. Verificou-se um aumento da notificação de pneumonia em estudos de pacientes com DPOC que receberam Seretide". Pode ocorrer hipocalemia transitória. Efeitos sistêmicos podem ocorrer com o uso de corticoides inalatórios em altas doses por períodos prolongados. Alguns efeitos sistêmicos proviveis induem sindrome de Cushing ou manifestações Cushingóides, supressão adienal, retardo no crescimento de crianças e de adolescentes (crianças devem ter seu crescimento monitorado), diminuição na densidade óssea, cafarata, quaucoma e conforetinopatia central serosa. Pacientes submetidos a situações de estresse ou em transferência de terapia de corticoides orais para via inalatória necessitam de cuidado especial e, por isso, a função adienocortical deve ser monitorada. Houve relatos ratos de aumento da glicemia. Como em outras terapias inalatórias, pode ocorrer broncoespasmo paradoxal com aumento imediato de sibilos. Nesses casos, o tratamento deve ser descontinuado. GRAVIDEZ ELACTIAÇÃO: O uso somente deve ser considerado se o beneficio esperado para a mãe for maior que qualquer risco para o feto. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O uso concomitante de β-bloqueadores seletivos e não seletivos deve ser evitado, a menos que existam razões suficientes para associação destes. Baixas concentrações plasmáticas do propionato de fluticasona são alcançadas após inalação, portanto, é improvável a ocorrência de interações medicamentosas clinicamente significativas. Efeitos sistêmicos foram observados em pacientes sob o uso de propionato de fluticasona e ritori por isso, o uso concomitante deve ser evitado. A coadministração de inibidores potentes do CYP3A4 (p. ex cetoconazol) pode aumentar a exposição sistêmica à fluticasona e ao salmeterol (podendo levar a um prolongamento do intervalo QTc). REAÇÕES ADVERSAS Muito comum: cefaleia. Comuns: candidíase oral e orofaringea, pneumonia (pacientes com DPOC). Incomuns: reações cutâneas de hipersensibilidade, disponeia, catarata, hiperglicemia, ansiedade, disturbios do sono, tremores, palpitações, taquicardia, fibrilação atrial, irritação na garganta, equimoses. Raras: reações anafiláticas, glaucoma, mudanças de comportamento, arritmias cardíacas, candidíase no esófago. Dados pós-comercialização. Raras: reações de hipersensibilidade, síndrome de Custing. supressão adrenal, retardo do crescimento em crianças e adolescentes, diminuição da densidade mineral óssea, distúrbos respiratórios, broncoespasmo paradoxal. SUPERDOSAGEM: Os sintomas de superdosagem para o salmeterol são tremor, cefaleia, taquicardia, elevação PMS e hipocalemia. Doses elevadas de propionato de fluticasona podem levar à supressão temporária da função adrenal, podendo levar a uma crise adrenal aquida, principalmente em crianças. Não há tratamento específico para uma superdosagem de salmeterol e propionato de fluticasona. Se correr superdosagem, os pacientes devem ser tratados com tecapia de supor e composito cura o recurso de la companhamento de contra de la companhamento del companhamento del companhamento de la companhamento del companhamento de la companhamento del companhamento de la c adversos, ocorridos durante o uso de medicamentos da GlaxoSmithKline, entre em contato o SAC Viver Mais através do telefone 0800 021 1311 ou do e-mail br. vivermais@gsk.com. PM-BR-NA-WBÁN-220002 - Fev/22







Utilizado no tratamento de problemas respiratórios em asma e outras doenças que envolvam as vias aéreas, como bronquite crônica e enfisema, que pode ser chamado de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

Fluir



CÓD. 101545 7891142156020FLUIR 12MCG C/30
CAPS + INAL



CÓD. 101546 7891142156211FLUIR 12MCG C/30
CAPS REFIL



CÓD. 101547 7891142156235FLUIR 12MCG C/60
CAPS REFIL



SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

FLUIR® fumarato de formoterol di-hidratado. Indicação: FLUIR® é utilizado no tratamento de problemas respiratórios em asma e outras doenças que envolvam as vias aéreas, como bronquite crônica e enfisema, que pode ser chamado de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Contraindicação: Não use Fluir® se você é al-dejigico (hipeseroshie) ao formotero ou a qualquere outro componente da formulação listado no início desta bula. Se isto se aplica a você, avise seu médico. MS: 17817.0791.

FLUIR®. Se você acha que pode ser alegigio, consulte seu médico. MS: 17817.0791.



sanofi

Allenasal

Um potente antialérgico indicado para o tratamento das rinites alérgicas sazonais e perenes em adultos e crianças.





CÓD. 403950 7891058022778ALLENASAL 55MCG SPR
NAS 120DOSES

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

ALLENASAL® (cloridrato de fexofenadina). Indicação: Allenasal é indicado para o tratamento das rinites alérgicas (inflamação na mucosa nasal) sazonais (que ocorre na mesma época do ano) e perenes (que persiste ao longo do ano) em adultos e crianças com idade igual ou superior a 2 anos. Contraindicação: Allenasal não deve ser utilizado por pacientes com alergia a qualquer um dos seus componentes. M.S: 1.8326.0447.





inverno é uma época propícia para a venda de hidratantes, protetores labiais, analgésicos, antitérmicos, lenços, medicamentos para alergias respiratórias, gripe e resfriados, além de vitaminas, exigindo revisão de compras, estoque, e sortimento das farmácias e drogarias. Para se preparar para a nova estação, o histórico de vendas no mesmo período do ano anterior deve ser analisado. É preciso identificar quais as categorias que tiveram maior giro, quais as que não atingiram bom desempenho e a partir daí, definir qual será o sortimento a ser trabalhado e quais as quantidades de compras que devem ser feitas para o abastecimento do estoque.

Neste momento, é fundamental conhecer os lançamentos da nova temporada, o que estará em alta, quais são as grandes apostas e que tipos de materiais promocionais estão sendo contemplados. Consulte os lançamentos em nosso *site* www.panpharma.com.br e fique por dentro das novidades!

A SAZONALIDADE TÍPICA
DO INVERNO REQUER QUE O
SORTIMENTO SEJA REVISTO
E QUE OS PRODUTOS DE
ALTO GIRO DA TEMPORADA
PASSEM A OCUPAR
DESTAQUE NAS GÔNDOLAS





Como definir o estoque para o inverno?







O histórico das vendas do ano anterior para usar como base para o ano atual.





O histórico da saída do mês anterior para usar como base das compras para o mês seguinte.





As informações concedidas pelos fornecedores, sobre as estimativas de lançamentos dos produtos novos.






As condições climáticas e de saudabilidade da estação atual.





A situação da pandemia provocada pela Covid-19.



O mix de produtos com apelo sazonal de

inverno deve ganhar mais espaço nas gôn-





As compras devem ser acrescidas proporcionalmente. O ideal é sempre analisar relatórios que demonstrem o giro e a demanda das principais curvas de compra. Baseando-se nesses dados é que se consegue planejar as compras e as necessidades de reposição.

De acordo com a GS&MD – Gouvêa de Souza, o destaque deve estar em produtos correlacionados com os que trarão o consumidor ao ponto de venda (PDV).

É evidente que uma pessoa resfriada irá buscar um medicamento para isso, por que não expor vitaminas e lenços? O consumidor irá automaticamente associar esses produtos com prevenção e como consequência do resfriado, possibilitando que o PDV aumente seu tíquete médio com produtos correlacionados.

O inverno é um período sazonal muito bem definido e, portanto, o aumento na demanda pelas categorias de produtos citados é praticamente automático. Além disso, as indústrias de higiene e beleza costumam realizar grande investimento em novos produtos baseados em estudos feitos, tanto no Brasil como no exterior, e ressalta a importância do acesso do varejo a informações de mercado.

O que levar em consideração para definir o mix



Localização da loja;



Poder aquisitivo do público da região;



Perfil do público;



Formato de loja (pequeno, médio ou grande);



Frequência de visitas dos clientes à loja;



Histórico de vendas;



Lançamentos e novidades da indústria;



Demanda do consumidor.



Os produtos para a nova estação devem estar disponíveis com, no mínimo, 15 dias de antecedência nas lojas. É importante alinhar a chegada dos produtos em loja *versus* marketing (tanto visual como boca a boca dos funcionários), transformando o atendimento em consultoria, com informações relevantes.

É importante trabalhar lugares como as pontas de gôndola, onde podem ser colocados produtos da estação; ilhas específicas também dão um bom destaque.



COMO REALIZAR UMA BOA AÇÃO DE TRADE PARA O INVERNO 2022

É preciso ter em mente que agora os consumidores estão tanto na loja física quanto nos meios digitais, por isso, é preciso trabalhar com engajamento nos dois canais, como:

1. Adote uma boa sinalização na loja física

Sua loja deve ser orientada pelas ações nos meios digitais. Então se você estiver promovendo uma campanha com descontos progressivos, por exemplo, é importante adotar o mesmo tipo de comunicação visual ponto de venda (PDV), a fim de criar uma identidade.

Reserve uma área para expor os produtos da campanha

Invista em etiquetas coloridas para destacar os itens sazonais

Planeje a comunicação para despertar a curiosidade dos clientes

2. Aposte em promoções digitais

Utilizar os canais digitais a seu favor pode ser uma estratégia poderosa. Sem contar que amplia o seu alcance, trazendo mais visibilidade para a loja. Uma promoção que costuma atrair os olhos da clientela é o desconto progressivo.

Quanto mais produtos o cliente comprar, maiores serão os descontos. É possível estipular um limite e agregar ofertas relacionadas para incentivar a venda. Outra boa estratégia é oferecer um cupom com bônus nas redes sociais para a próxima compra no site.

3. Estabeleça metas para campanhas

Para que as campanhas de inverno no varejo sejam, de fato, efetivas, precisamos definir metas. O que queremos alcançar com elas? Apenas "atrair mais clientes" não é um objetivo, já que ele deve ser mensurável.

A recomendação é que você estipule um número ou percentual de conversões esperadas e prazos para que isso aconteça. Dessa maneira, fica mais fácil acompanhar se os resultados estão sendo alcançados e se a campanha precisa de ajustes.

4. Avalie resultados periodicamente

Tão importante quanto implementar ações e estipular metas é mensurar os efeitos na prática. Por isso, é importante definir objetivos mais específicos e prazos para que você possa fazer um acompanhamento periódico e avaliar o retorno do investimento.

Não tem como seguir os resultados se a ideia é apenas "atrair mais clientes", mas isso se torna possível se a finalidade for "aumentar a base de clientes em 5% nos próximos três meses", por exemplo. A avaliação ajudará a guiar a estratégia desta e das próximas campanhas.

5. Busque parcerias com a indústria

Conheça os lançamentos previstos para a temporada, se haverá materiais específicos para serem implementados, *kits* promocionais, além de condições parceiras de pagamento.



Fonte: Linstex



Amoxil

Indicado para tratamento de infecções bacterianas causadas por germes sensíveis à acão da amoxicilina.







CÓD. 105585 7896015556990 AMOXIL 500MG C/ 21 COMP

CÓD. 105580 7896015591441 AMOXIL 250MG SUSP 150ML

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

AMOXIL® cápsula e suspensão oral (amoxicílina). Indicações: Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 mg / 5 ml) devem ser utilizados de acordo com as diretrizes locais para prescrição de antibióticos e dados de sensibilidade local. Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 mg / 5 ml) para administração oral três vezes ao dia são indicados no tratamento de curta duração das infecções bacterianas nas seguintes áreas; infecções do trato respiratório superior, em particular rinossinusite, otite média e faringoamigdalite aguda; Infecções do trato respiratório inferior, em particular bronquiectasia e pneumonia adquirida na comunidade. Para administração oral uma vez ao dia são indicados no tratamento de curta duração das infecções bacterianas nas seguintes áreas: infecções do trato genitourinário, em particular gonorieia; Infecções do trato digestivo, em particular erradicação do Helicobacter pylori. Contraindicações: Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml) são contraindicados para pacientes com hipersensibilidade a betalactâmicos (penicilinas, cefalosporinas) Precauções e Advertências: Antes de iniciar o tratamento com Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml) são contraindicados para pacientes com hipersensibilidade a betalactâmicos (penicilinas, cefalosporinas) Precauções e Advertências: Antes de iniciar o tratamento com Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml) e 500 mg/5 ml), deve-se fazer uma pesquisa cuidadosa sobre reações prévias de hipersensibilidade a penicilinas e cefalosporinas ou a outros alérgenos. Reações de hipersensibilidade graves e ocasionalmente fatais foram relatadas em pacientes recebendo tratamento com penicilina. Deve-se evitar o uso de Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml) e 500 mg/5 ml) em pacientes sob suspeita de mononucleose, uma vez que a ocorrência de rash cutâneo de aspecto morbiliforme tem sido associada à amoxicilina. Foi relatada colite pseudomembranosa com o uso de antibióticos, que pode ter gravidade variada entre leve à risco de vida. Portanto, é importante considerar o diagnóstico em pacientes que desenvolvam diarreia durante ou após o uso de antibióticos. Se ocorrer diarreia prolongada ou significativa, ou o paciente sentir cólicas abdominais, o tratamento deve ser interrompido imediatamente e a condição do paciente deve ser investigada. Amoxil[®] suspensão oral 250mg/5mL e 500mg/5mL contêm aspartame e, portanto, deve-se ter cautela na fenilcetonúria, e também contêm benzoato de sódio, podendo aumentar o risco de icterícia em recém-nascidos. Houve relatos raros de prolongamento anormal do tempo de protrombina (aumento da razão normalizada internacional – INR) em pacientes tratados com Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 mg/5 ml) e anticoagulantes orais. Deve-se efetuar moniforamento apropriado em caso de prescrição concomitante de anticoagulantes. Não é recomendável para pacientes com insuficiência renal moderada ou grave. Nos pacientes que apresentaram redução da diurese, raramente se observou cristalúria, que ocorreu sobretudo com terapia parenteral. Durante a administração de altas doses de amoxicilina, é recomendável que se mantenha ingestão adequada de líquidos para reduzir a possibilidade de cristalúria associada à amoxicilina. Não se observaram efeitos adversos sobre a capacidade de dirigir veículos e de operar máquinas. Uso em Gravidez e Lactação: Categoria B de risco na gravidez. Assim como em todos os medicamentos, o uso de Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml) e 500 mg/5 ml) devem ser evitados durante o primeiro trimestre da gravidez, a menos que sejam considerados essenciais pelo médico. Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml) e 500 mg/5 ml) podem ser administrados durante o período de lactação. Reações adversas: A maioria dos efeitos colaterais abaixo não são exclusivos do Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 mg/5 ml) e podem ocorrer com o uso de outras penicilinas. Comuns: diarreia e náusea, rash cutâneo. Incomuns: vômito, urticária e prurido. Muito Raras: leucopenia reversível (inclusive neutropenia grave ou agranulocitose), trombócitopenia reversível e anemia hemolítica, prolongamento do tempo de sangramento e do tempo de protrombina, edema angioneurótico, anafilavia, vasculite por hipersensibilidade e doença do soro, hipercinesia, vertigem, convulsões e meningite asséptica, candidíase mucocutânea, colite associada a antibióticos, descoloração superficial dos dentes em crianças (somente em suspensão oral), línqua pilosa negra, hepatite e icterícia colestásica, aumento moderado de AST ou ALT, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrose epidérmica tóxica, dermatite esfoliativa e bolhosa, exantema pustuloso generalizado aquido (se ocorrer qualquer reação dermatológica de hipersensibilidade, o tratamento deve ser descontinuado), nefrite intersticial e cristalúria (associada ao uso da amoxicilina em alta dose, em alguris casos pode levar à insuficiência renal), eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS). Interações com medicamentos, alimentos ou álcool: O uso concomitante de probenecida não é recomendado pois pode resultar em aumento e prolongamento dos níveis de amoxicilina no sangue. Amoxil[®] 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 mg/5 ml) devem ser usados com cautela em pacientes recebendo anticoagulantes. Em comum com outros antibióticos, a amoxicílina pode afetar a flora intestinal, levando a uma menor reabsorção de estrogênio e eficácia reduzida de contraceptivos orais combinados. O uso de alopurinol durante o tratamento com amoxicílina pode aumentar a probabilidade de reações alérgicas de pele. Durante o uso de amoxicilina, recomenda-se utilização de métodos de glicose oxidase enzimática quando houver necessidade de realização de testes para verificação de glicose na urina. Em caso de uso concomitante de amoxicílina e acenocumarol ou varfarina, recomenda-se monitoramento do tempo de protrombina ou o INR com a introdução ou retirada da amoxicílina. Posologia: Adultos e crianças acima de 40 kg: 1 comprimido de Amoxil® 500 mg 3 vezes ao dia. Tratamento de curta duração: na gonorreia: dose única de 3 g; erradicação de Helicobacter pylori: dose de 1 g duas vezes ao dia por 7 dias. Crianças abaixo de 40 kg: a dose usual diária recomendada é 20 a 50 mg/kg/dia, em doses divididas, três vezes ao dia por 7 dias. Crianças abaixo de 40 kg: a dose usual diária recomendada é 20 a 50 mg/kg/dia, em doses divididas, três vezes ao dia, até um máximo de 150 mg/kg/dia, em doses divididas. Superdosagem: É pouco provável que, em caso de superdosagem, ocorram problemas. Se observados, efeitos gastrointestinais podem ser evidentes e devem ser tratados sintomaticamente, com atenção ao equilibiro hidroeletrolítico. Há a possibilidade da amoxicilina causar cristalúria, e em alguns casos, poder levar à insuficiência renal Amoxil[®] 500 mg e Amoxil[®] suspensão oral (250 mg/S ml e 500 mg/S ml) podem ser removidos da circulação por hemodiálise. Para dados completos sobre a segurança do medicamento, a bula na ínterga deverá ser consultada e poderá ser solicitada à empresa através do Serviço de Informação Médica da GSK (0800 701 22 33 ou medinfo@gsk.com). VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM
RETENÇÃO DA RECEITA. GlavoSmithKline Brasil. MS: 1.0107.0003. m8L_11320_amoxil_cap_gel_dura_amoxil_po_sus_GIOS31_IPI13. Material destinado exclusivamente para distribuidores, revendedores e balconistas. É estritamente profibida a distribuição para pacientes. Para notificar informações de segurança, incluindo eventos adversos, ocorridos durante o uso de medicamentos da GlaxoSmithKline, entre em contato o SAC Viver Mais através do telefone 0800 021 1311 ou do e-mail br.vivermais@gsk.com. PM-BR-NA-WBAN-220002 - Fev/22









Redoxitos

que ajuda a reforçar as defesas do corpo e dar o suporte diário para o do sistema imunológico da criança.

CÓD. 708280 4008500018064 REDOXITOS MORANGO 25 UNIDADES





CÓD. 709019 7891106911504 **REDOXITOS MAIS** MIX FRUT C/25 UN



CÓD. 705784 7891106908535 **REDOXITOS LARANJA** 25 UNIDADES



CÓD. 708169 4008500018118 **REDOXITOS UVA** 25 UNIDADES

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

REDOXITOS®, SUPLEMENTO ALIMENTAR EM GOMAS, Produto recomendado para crianças a partir de 4 anos. ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO, NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA

NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. REDOXITOS®. SUPLEMENTO ALIMENTAR EM GOMAS. Produto recomendado para crianças a partir de 4 anos. ESTE PRODUTO NÃO É

UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.







Redoxon

Fórmula avançada com vitamina C + D + zinco, que fortalecem a imunidade.



CÓD. 401107 7891106006279REDOXON 1G EFV
C/10 COMP - NOVO



CÓD. 402330 7891106907118REDOXON 1G LARANJA
TRIPLE PACK



CÓD. 401109 7891106006262REDOXON 2G
EFV LIMA-LIM
10CP-NOV



CÓD. 401104 7891106006286 REDOXON GTS 20ML



CÓD. 715228 7891106912655REDOXON TRIPLA
ACAO C/10 COMP



CÓD. 715236 7891106912662REDOXON TRIPLA ACAO C/30 COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

REDOXON® (ácido ascórbico 500 mg). Suplemento alimentar em comprimidos. Produto recomendado para adultos e crianças acima de 9 anos. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Alérgicos: contém derivados de leite. Contém lactose. Não contém glúten. RCR 2020-09-02-191. REDOXON® TRIPLA AÇÃO. Suplemento alimentar em comprimido efervescente. Produto indicado para adultos e crianças acima de 12 anos. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Não contém glúten. REDOXON® GOTAS (ácido ascórbico 200mg/ml). Reg. MS: 1.7056.0016. Indicado como suplemento vitamínico auxiliar ou sixilem a univalidar do sistema imunológico, antioxidante, pós-criúrgico e cicativante, doenças crônicas e convalescença, dietas restritivas e inadequadas, como auxiliar nas anemias carenciais e como suplemento vitamínico para recém-nascidos, lactentes e crianças em fase de crescimento. REDOXON® 1G (ácido ascórbico 1g). Reg. MS: 1.7056.0016. Indicado como suplemento vitamínico auxiliar do sistema imunológico, antioxidante, pós-criúrgico e cicativante, doenças crônicas e convalescença, dietas restritivas e inadequadas, como auxiliar nas anemias carenciais e como suplemento vitamínico auxiliar do sistema imunológico, antioxidante, pós-criúrgico e cicativante, doenças crônicas e convalescença, dietas restritivas e inadequadas, como auxiliar nas anemias carenciais e como suplemento vitamínico para recém-nascidos, lactentes e crianças em fase de crescimento. REDOXON® 1G (ácido ascórbico 1g). Reg. MS: 1.7056.0016. Indicado como suplemento vitamínico auxiliar do sistema imunológico, antioxidante, pós-criúrgico e cicativante, doenças crônicas e convalescença, dietas restritivas e inadequadas, como auxiliar nas anemias carenciais e como suplemento vitamínico para recém-nascidos, lactentes e crianças en fase de crescimento.









CÓD. 107160 7897322709727ADDERA D3 7.000UI C/4 CAPS GEL



CÓD. 107161 7897322709758ADDERA D3
50.000UI C/4
CAPS GEL



CÓD. 107163 7897322709734ADDERA D3
7.000UI C/10
CAPS GEL



CÓD. 107351 7897322709475ADDERA D3
7.000 UI C/10
COMP



CÓD. 109563 7897322709482ADDERA D3
7000UI C/30
COMP REV



CÓD. 109564 7897322709499ADDERA D3
10000UI C/4
COMP REV



CÓD. 109565 7897322709505ADDERA D3
10000UI C/10
COMP REV



CÓD. 109566 7897322709987ADDERA D3
10.000UI C/4
CAPS GEL



CÓD. 109567 7897322709994ADDERA D3
10000UI C/10
CAPS GEL



CÓD. 402391 7897322709468ADDERA D3
7.000 UI
C/4 COMP



CÓD. 402393 7897322709529ADDERA D3
50.000 UI
C/4 COMP



CÓD. 109894 7897322709451ADDERA D3
5.000UI C/30
COMP REV



CÓD. 109895 7897322709970ADDERA D3
5.000UI C/30
CAPS GEL



CÓD. 110666 7896094917866ADDERA D3
50.000 UI C/8
COMP REV



CÓD. 110667 7896094917873ADDERA D3
50.000 UI C/8
CAPS GEL

CONFIRA TAMBÉM:

CÓD.	EAN	DESCRIÇÃO	CÓD.	EAN	DESCRIÇÃO
109780	7897322709536	ADDERA D3 50.000 UI C/10 COMP	110721	7896094918061	ADDERA D3 50.000 UI C/6 COMP REV
109781	7897322709765	ADDERA D3 50.000 UI C/10 CAPS GEL	110896	7897322709741	ADDERA D3 7.000UI C/ 30 CAPS GEL
110719	7896094918078	ADDERA D3 50.000 UI C/6 CAPS GEL			

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

ADDERA D3 colecalciferol. Indicação: Addera D3 (colecalciferol) é um medicamento a base de vitamina D, indicado como suplemento vitaminico em dietas restritivas e inadequadas. É destinado à prevenção e tratamento auxiliar na desmineralização óssea (retirada dos minerais dos ossos) pré e pós-menopausa, e na prevenção de raquitismo (enfraquecimento dos ossos). Contraindicação: Addera D3 (colecalciferol) não deve ser utilizado em pacientes que apresentam hipervitaminose D (excesso de vitamina D), elevadas taxas de cálcio ou fosfato na corrente sanguinea e também em casos de má-formação nos ossos. Este medicamento é contraindicado para crianças com peso inferior a 3,3 kg. MS: 1.7817.0028.







CÓD. 402390 7896094919440 ADDERA D3 1.000 UI C/30 COMP



CÓD. 400034 7896094920538ADDERA D3 132UI
GTS FR 10ML



CÓD. 403981 7896094919594ADDERA D3 600UI
GTS FR 5ML



CÓD. 404010 7896094918634ADDERA D3 1000UI
GTS FR 5ML



CÓD. 404330 7896094920279ADDERA D3 1.000UI
C/30 CAPS GEL



CÓD. 404380 7896094919556ADDERA D3 2000UI
FRAS C/30CP REV



CÓD. 404381 7896094919570ADDERA D3 2000UI FRAS C/90CP REV



CÓD. 404382 7896094921153 ADDERA CAL 1000UI FRAS C/30COMP



CÓD. 404383 7896094919259ADDERA+CABELO E UNHA FR C/30COMP



CÓD. 404384 7896094919266ADDERA+CABELO E UNHA FR C/90COMP



CÓD. 404386 7896094919297ADDERA+ENERGIA
FR C/90 COMP REV



CÓD. 404387 7896094919310ADDERA+IMUNIDADE
FR C/30CP REV



CÓD. 404390 7896094919327ADDERA+IMUNIDADE
FR C/90CP REV



CÓD. 404391 7896094919341ADDERA+VITAMINAS
FR C/30CP REV



CÓD. 404392 7896094919358ADDERA+VITAMINAS
FR C/90CP REV



CÓD. 404400 7896094921139ADDERA CAL 2.000UI
FR C/90 COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

ADDERA D3 colecalciferol. Indicação: Addera D3 (colecalciferol) é um medicamento a base de vitamina D, indicado como suplemento vitamínico em dietas restritivas e inadequadas. É destinado à prevenção e tratamento auxiliar na desmineralização óssea (retirada dos minerais dos ossos) prê e pós-menopausa, e na prevenção de raquitismo (enfraquecimento dos ossos). Contraindicação: Addera D3 (colecalciferol) não deve ser utilizado em pacientes que apresentam hipersensibilidade aos componentes da fórmula. É contraindicado também para pacientes que apresentam hipersitaminose D (excesso de vitamina D), elevadas taxas de cálcio ou fosfato na corrente sanguínea e também em casos de má-formação nos ossos. Este medicamento é contraindicado para crianças com peso inferior a 3,3kg. MS: 1.7817.0028.









CÓD. 404415 7896094921160ADDERA CAL 1.000UI
FR C/90 COMP



CÓD. 404411 7896094921122ADDERA CAL 2000UI
FRAS C/30 COMP



CÓD. 404414 7896094919532 ADDERA D3 1000UI FRAS C/90CP REV



CÓD. 404413 7896094919518ADDERA D3 1000UI
FRAS C/30CP REV



CÓD. 404410 7891142206688ADDERA D3 FLASH
2000UI 30 F HORT



CÓD. 404430 7891142206640ADDERA D3 FLASH
800UI 30 FL MOR



CÓD. 404470 7896094920521 ADDERA D3 132UI GTS 20ML



CÓD. 404471 7896094920507 ADDERA D3 400UI GTS 10ML



CÓD. 715026 7896094917712 ADDERA D3 2.000UI C/30 CAPS GEL



CÓD. 404670 7891142207388ADDERA+IMUNIDADE KIDS 600UI 75ML

CONFIRA TAMBÉM:

CÓD.	EAN	DESCRIÇÃO	CÓD	. EAN	DESCRIÇÃO
112475	7891142206404	ADDERA D3 60.000UI C/2 CAPS GEL	11247	7891142206329	ADDERA D3 14.000UI C/4 CAPS GEL
112471	7891142206305	ADDERA D3 4.000UI C/30 CAPS GEL	11247	4 7891142206367	ADDERA D3 30.000UI C/2 CAPS GE
112472	7891142206954	ADDERA D3 4.000UI C/90 CAPS GEL			

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

ADDERA D3 colecalciferol. Indicação: Addera D3 (colecalcíferol) é um medicamento a base de vitamina D, indicado como suplemento vitamínico em dietas restritivas e inadequadas. É destinado à prevenção e tratamento auxiliar na desmineralização óssea (retirada dos minerais dos ossos) pré e pós-menopausa, e na prevenção de raquitismo (enfraquecimento dos ossos). Contraindicação: Addera D3 (colecalcíferol) não deve ser utilizado em pacientes que apresentam hipervitaminose D (excesso de vitamina D), elevadas taxas de cálcio ou fosfato na corrente sanguinea e também em casos de má-formação nos ossos. Este medicamento é contraindicado para crianças com peso inferior a 3,3 kg. MS: 1.7817.0028.







CÓD. 715360 7896094917965VITASAY 50+ A-Z
HOMEM+CAFEINA
FR 30 CPRV



CÓD. 715361 7896094917972VITASAY 50+ A-Z
HOMEM+CAFEINA
FR 60 CPRV



CÓD. 715761 7896094917989VITASAY 50+ A-Z
MULHER FR 30 CPRV



CÓD. 715762 7896094917996VITASAY 50+ A-Z
MULHER FR 60 CPRV



CÓD. 715359 7896094918023 VITASAY 50+ BELLA FR 60 CPRV



CÓD. 715759 7896094918009 VITASAY 50+ CALCIO FR 30 CPRV



CÓD. 715760 7896094918016 VITASAY 50+ CALCIO FR 60 CPRV



CÓD. 715358 7896094918047VITASAY 50+ IMUNE
FR 30 CPRV



CÓD. 717048 7896094920606VITASAY 50+ PROOMEGA 3 FR 60CAP



CÓD. 717018 7896094920583VITASAY 50+
SERENNE FR 60CAP



CÓD. 717019 7896094920569VITASAY 50+ VITALY
FR 60CAP



CÓD. 717962 7896714275253 BLUMEL IMUNE SOL ORAL 60ML









Bion 3

Multivitamínico que combina o poder dos probióticos com a força das vitaminas reforçando as defesas naturais do organismo.



CÓD. 716920 7891721029370 BION 3 60CP



CÓD. 707730 7891721028694 BION 3 30CP



CÓD. 400268 7891721022128CEBION AP LIB M
500MG C/30 COMP



CÓD. 400272 7891721104831CEBION EFV 1G C/10
COMP S/ACUCAR







CÓD. 400271 7891721100017CEBION EFV 1G
C/10 COMP



CÓD. 100671 7891721100024CEBION EFV 2G
C/10 COMP



SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

BION®3 (Lactobacillus acidophilus) com vitaminas e minerais em tabletes coloridos artificialmente. 1 Tablete contém 108 ufc de lactobacillus acidophilus. M.S. 4.1077.0305.001-5. CEBION® (ácido ascórbico). Indicações: Este produto é um suplemento vitamínico indicado como auxiliar do sistema imunológico. Contraindicações: Este produto é um suplemento vitamínico indicado como auxiliar do sistema imunológico. Contraindicações: Este produto é contraindicado em pacientes com: conhecida hipersensibilidade (alergia) ao ácido ascórbico ou a qualquer um dos componentes da fórmula; cálculos urinários; história de níveis elevados de ácido úrico; doenças de armazenamento de ferro (como talassemia, hemocromatose e anemia sideroblástica); úlceras gástricas. MS: 1.2142.0668.



sanofi



CÓD. 400323 7897595900708 CEWIN 200MG GTS 20ML



CÓD. 400322 7897595900685 CEWIN 1G EFV C/10 COMP



CÓD. 717500 7891058000295 CEWIN 500MG C/30 COMP FOOD



Targifor C

Ajuda a combater o cansaço físico e mental, além de fortalecer sua imunidade.



CÓD. 401260 7891058004668 TARGIFOR C C/30 COMP



CÓD. 401261 7891058004675TARGIFOR C C/60
COMP



CÓD. 401262 7891058021931TARGIFOR C EFV
C/16 COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

CEWIN® (citrato de orfenadrina, dipirona sódica, cafeína anidra). Indicação: Cewin é indicado nos estados em que há aumento das necessidades de vitamina C no organismo. Contraindicação. M.S. Medicamentos à base de vitamina C não devem ser utilizados por: Pacientes com hipersensibilidade (alergia) ao ácido ascórbico ou a qualquer outro componente do produto; Pacientes com cálculo nos rins ou com presença de oxalatos ou ácido oxálico na urina (substâncias que formam os cálculos renais). Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com falência ou insuficiência renal grave. 1.8326.0457.

TARGIFOR® (® (arginina). Indicação: TARGIFOR® C contêm arginina, que age naturalmente em seu organismo, ajudando a combater o cansaço físico e mental. Contraindicação: Não deve ser utilizado nos seguintes casos: Pacientes com hipersensibilidade (alergia) à arginina, à vitamina C ou a qualquer outro componente da fórmula; Pacientes com cálculos renais (pedras nos rins) acompanhada por oxalúria (presença de cristais de oxalato, geralmente de cálcio na urina) e insuficiência renal severa. M.S: 7891058004668







Bepantol

Linha de hidratantes que fornece uma hidratação intensa e regeneração profunda, além de ser uma solução para as áreas mais ressecadas do corpo, tatuagens, rosto, lábios e cabelos.



CÓD. 707163 7891106908870BEPANTOL DERMA
REG LABIAL 7,5ML



CÓD. 717172 7891106914277BEPANTOL DERMA
PROT LAB F50 4,5G



CÓD. 709625 7891106911733BEPANTOL DERMA
CREME 40G





CÓD. 704333 7891106907293BEPANTOL DERMA SOL 50ML



CÓD. 704343 7891106907286 BEPANTOL DERMA CREME 20G



CÓD. 707820 7891106909624BEPANTOL DERMA
SOL SPRAY 50ML



CÓD. 715496 7891106913522BEPANTOL DERMA
TOQUE SECO CR 30G



NOVA LINHA CORPORAL

CÓD. 718992 7896235354178HIDR MONANGE Q10
P EXT SEC 200ML

Maciez, nutrição ou firmeza?

Para cada tipo de pele, um cuidado especial.



CÓD. 718999 7896235354154HIDR MONANGE HID DETOX 200ML

CÓD. 719000 7896235354161HIDR MONANGE Q10
P NORM-SEC 200ML

CÓD. 718993 7896235354185HIDR MONANGE
MAOS Q10 **75**G

monange siga seu coração

nova linha PAIXÃO

Provoque deliciosas sensações com diferentes texturas e fragrâncias inesquecíveis.

Com óleo de amêndoas **CÓD. 702411 78907850**LEITE PAIXAO
INSPI HID 200ML

INSPIRADOR Rosas Branca **CÓD. 719137 7896235354123**LC PAIXAO ULT CR
INSPI ROSA 200ML



CÓD. 702721 78907874OLEO AMENDOA
PAIXAO INSPI 200ML



GALDERMA



A linha cuida das peles sensíveis, com limpeza, fotoproteção e hidratação.



CÓD. 700543 7897930776067CETAPHIL
ADVANCED
MOISTURIZ 473G



CÓD. 717406 3499320007979CETAPHIL CR
FACIAL NOTURNO
48G



CÓD. 700542 7897930776050CETAPHIL
ADVANCED
MOISTURIZ 226G



CÓD. 700544 7502003560565CETAPHIL
CR HIDRAT
250G





7897930762053CETAPHIL CR
HIDRAT 453GR



CÓD. 716271 3499320009775CETAPHIL ESP LIMP FACIAL 236ML



7897930777408CETAPHIL LC120ML+HID250G
+SUN F60



GALDERMA



CÓD. 700550 7897930761971 CETAPHIL LC LIMPEZA 120ML



CÓD. 700551 7897930761612CETAPHIL LC
LIMPEZA 300ML



CÓD. 705732 3499320004497CETAPHIL PRO AC
ESPUMA LIMP 236ML



CÓD. 715337 3499320004473 CETAPHIL PRO AC LOCAO 118ML



CÓD. 716242 3499320007986CETAPHIL LOC FAC
HIALURONIC 88ML



CÓD. 717289 7897930777309CETAPHIL LOC
HIDRAT 59ML



CÓD. 717594 7897930762060CETAPHIL LOC
HIDRATANTE 473ML



CÓD. 717420 7897930777316CETAPHIL LOC
LIMPEZ 59ML



CÓD. 717293 7897930777323CETAPHIL PRO ESP
HIDR 100ML



CÓD. 704077 7897930775794CETAPHIL REST PRO LC HIDRA 295ML



CÓD. 704078 7897930775800CETAPHIL REST PRO SAB LIQ 295ML



CÓD. 717381 7897930777163CETAPHIL LIMP
SUAVE L3P2 127G









a None

Epidrat

Hidratante corporal para pele seca com ação antioxidante.

CÓD. 708533 7891142200341EPIDRAT CORPO
INTENSIVO FR 200G



CÓD. 701552 7891142143037EPIDRAT LABIOS FPS30 5,5G



CÓD. 708503 7891142200235EPIDRAT CALM
40G



CÓD. 718497 7891142205551EPIDRAT CALM
B5 BG 20ML



CÓD. 718496 7891142205544 EPIDRAT CALM B5 BG 50ML



CÓD. 714652 7891142204677GLYCARE LOCAO
120ML



CÓD. 714986 7891142204547HYDRAPORIN AI
BISNAGA 120G



CÓD. 714985 7891142204554HYDRAPORIN AI
FRASC 450G



CÓD. 715471 7891142204288HYDRAPORIN AI SAB
LIQ BG 200ML







Fusion Water

Protetor solar facial de fase aquosa e textura ultraleve para uso diário. Com absorção imediata e controle da oleosidade da pele sem deixar resíduos. Com ácido hialurônico que proporciona a hidratação da pele. Para uso diário, inclusive no inverno.



CÓD. 717100 8429420197985ISDIN FUSION
WATER FPS60
50ML



CÓD. 718201 8429420205192FUSION WATER
COLOR FPS 50 50ML



CÓD. 718481 8429420225718ISDIN FUSION WATER FPS60 30ML



CÓD. 717886 8429420215504 ISDIN UREADIN LC HIDRAT 10 100ML



CÓD. 707553 8429420078581ISDIN ACTIVE UNIFY COLOR FPS99 50ML



CÓD. 708570 8429420093232ISDIN ACTIVE UNIFY S/ COR FPS99 50ML



CÓD. 717845 8429420145757ISDIN UREADIN
BATH GEL 100ML



ISDIN LOVE YOUR SKIN



CÓD. 401346 7896422506564 UREADIN 20% CR 50G



CÓD. 704967 8429420157552 UREADIN 10 LOCAO 400ML



CÓD. 706172 8429420157545UREADIN RX 10 LOCAO
PLUS 400ML



CÓD. 712300 8429420121959 UREADIN GEL BANHO 424 GR



ISDIN
Ureadin
Loção 10

Loção
Hidratante
10x treis (SDIN
Ureadin
Loção 10

Loção
Hidratante
10x treis (SDIN
Hidratante
10x treis

CÓD. 714944 8429420143050 UREADIN 10 LOCAO 200ML



CÓD. 708563 8429420083349UREADIN MAOS
51,5G



CÓD. 715420 8429420140196UREADIN CR HID
MAO PE ULTRAK 53G



CÓD. 706174 8470001527349 UREADIN PODOS GEL OIL 80,25G



CÓD. 709987 8429420112926UREADIN PODOS
DIABETE 102GR



Johnson Johnson



CÓD. 702659 70501812921NEUTROG NORWEGIAN
CR MAOS 56G



CÓD. 702656 7891010814977NEUTROG NORW
CR HID MAO 56G



CÓD. 702657 7891010814953NEUTROG NORW
HD CORP IN 200ML



CÓD. 704939 7891010966225NEUTROG NORW
CORP FRAG 200ML



CÓD. 708353 7891010611330NEUTROG NORW
HD CORP IN
500ML



CÓD. 708352 7891010611347NEUTROG NORW
HD CORP FRAG
500ML



CÓD. 715511 7702031310914NEUTROG BOOST
HYDR WAT GEL
400ML



CÓD. 717741 7702031399858NEUTROG
HYDRO BOOST
GEL 200ML



CÓD. 717980 7891010253813NEUTROG HIDRA
MATTE 3 EM 1
100G



CÓD. 717982 7891010253790NEUTROG
ANTISSINAIS
FPS22 100G



CÓD. 718080 7891010253806NEUTROG
ANTISSINA
REPARADOR 100G



CÓD. 718053 7891010253257NEUTROG HIDRA & REVITALIZA 400ML



CÓD. 718018 7891010253899NEUTROG
HIDRATA &
REPARA 200ML



CÓD. 718019 7891010253905NEUTROG
HIDRATA &
REPARA 400ML



CÓD. 718054 7891010253929NEUTROG
HIDRATA &
SUAVIZA 200ML



CÓD. 718055 7891010253936NEUTROG
HIDRATA &
SUAVIZA 400ML

Johnson Johnson



Nutri SPA

Combinação de ativos que hidratam e protegem a pele com textura ultraleve.



CÓD. 716675 7891010249410LC J&J SERUM
ARG AM KAR
200ML



CÓD. 716674 7891010247584LC J&J AMEN
ARGAN KARIT
200ML



CÓD. 716922 7891010247591LC J&J AMEN
ARGAN KARIT
400ML



CÓD. 716711 7891010253004LC J&J SERUM
DAILY BALANCE
200ML



CÓD. 716923 7891010253028LC J&J DAILY
BALANCE
400ML



CÓD. 716682 7891010253011LC J&J DAILY
BALANCE
200ML



CÓD. 716684 7891010248796LC J&J ROMA
RENOVADORA
200ML



CÓD. 716685 7891010248772LC J&J ROSAS E
SANDALO
200MI



CÓD. 716676 7891010248857LC J&J SERUM
ILUMINADO
200ML



CÓD. 716683 7891010248833LC J&J
ILUMINADORA
200ML



CÓD. 716681 7891010248758LC J&J LAVANDA
CAMOMILA
200ML



CÓD. 716924 7891010248765LC J&J LAVANDA
CAMOMILA
400ML



CÓD. 716925 7891010248789LC J&J ROSAS E
SANDALO
400ML



L'ORÉAL Cosmética Ativa



CeraVe

Contém três ceramidas essenciais para pele + ácido hialurônico promovendo hidratação o dia todo por meio de sua exclusiva tecnologia MVE de liberação prolongada de ativos hidratantes.



CÓD. 714772 7899706186698CRV LOÇÃO FACIAL
HIDRATANTE 52ML



CÓD. 714181 7899706159272CRV LOCAO
HIDRATANTE 473ML



CÓD. 716839 7899706182980CRV CREME
HIDRATANTE 50G



CÓD. 714184 7899706159173CRV CREME
HIDRATANTE 200G



CÓD. 714182 7899706159197CRV CREME
HIDRATANTE 454G



CÓD. 714773 7899706183116CRV CREME DE MÃOS 50G



CÓD. 717458 7899706187657CRV CREME DE MÃOS 100G



CÓD. 714183 7899706159258HIDRATANTE
200ML



L'ORÉAL Cosmética Ativa



CÓD. 714775 3337875597296CRV SA RENEW
FOOT CREAM 89ML



CÓD. 714185 7899706159333CRV LOCAO DE LIMP
HIDRAT 200ML



CÓD. 714779 7899706159357CRV LOCAO DE LIMP
HIDRAT 473ML



CÓD. 715737 7899706172707CRV GEL DE
LIMPEZA 60G



CÓD. 715738 7899706172721CRV GEL DE
LIMPEZA 150G



CÓD. 715739 7899706172745CRV FOAMING FACIAL CLEANSER 454G



CÓD. 705994 7899706124805LRP CICAPLAST
BAUME B5 40ML



CÓD. 708526 7899706124829LRP CICAPLAST
BAUME B5 20ML



CÓD. 708572 7899706124874 LRP CICAPLAST LABIOS 7,5ML







Nivea Milk

Possui hidratação intensa e imediata com ação desodorante. Dermatologicamente testado. Garante 48 horas de hidratação.





CÓD. 702387 4005808315697LC NIVEA BODY
MILK 400ML



CÓD. 714392 4005900498205LC NIVEA FIRM Q10
PELE SECA 200M



CÓD. 714573 4005900549266LC NIVEA FIRM Q10
VITC 400ML



CÓD. 702385 4005808310999LC NIVEA BODY
LOTION 200ML



CÓD. 702381 4005808311286LC NIVEA BODY FIRM Q10 PLUS 200M



CÓD. 709744 4005900116192LC NIVEA BODY FIRM Q10 PLU 400ML



CÓD. 702390 4005808335435LC NIVEA BODY
SOFT MILK 200ML



CÓD. 702391 4005900004956LC NIVEA SOFT
MILK 400ML



CÓD. 707365 4005808840625LC NIVEA BANHO
MILK 250ML



CÓD. 707839 4005900111104LC NIVEA BANHO
SOFT MILK 250ML







CÓD. 715208 4005900442659CR NIVEA LATA
MEN 75G



CÓD. 715209 42355465CR NIVEA LATA
MEN 30G



CÓD. 701021 42110200CR NIVEA SOFT PT 48G



CÓD. 701022 4005808890590CR NIVEA SOFT PT 97G



CÓD. 702913 4005808850617PROTETOR LAB
ORIGINAL CARE 4.8G



CÓD. 710474 42277217 CR NIVEA LATA 29G



CÓD. 701018 78906617 CR NIVEA MD 56G



CÓD. 701019 7891177801308CR NIVEA PT
97G



CÓD. 710869 4005900408891 CR NIVEA LATA 145GR



CÓD. 715826 4005900669292LC NIVEA COCO E
OLEO MONOI 200ML



CÓD. 715827 4005900669308LC NIVEA FLOR DE CEREJEIRA 200ML



CÓD. 715828 4005900669278LC NIVEA FLOR DE LARANJEI 200ML



CÓD. 710701 4005900399861CR NIVEA HIDR
DERMA CARE 200ML



CÓD. 702378 4005808881512LC NIVEA ANTI
CELULITE BYE 201G



CÓD. 701020 4005808846290LC NIVEA HAND
ANTIDADE Q10 75G



CÓD. 717010 4005900704337CR NIVEA P/MAOS
REPARACAO 75G



CÓD. 718289 4005900860507CR NIVEA P/MAOS
3EM1 ANTIBAC 75G



